Ozurdex® Patiëntengids

(dexamethason intravitreaal implantaat 0.7mg)

Informatie voor de patiënt.

Let op bij gebruik van dexamethason. Dit medicijn is een implantaat voor gebruik in het oog. Dexamethason is de werkzame stof in het medicijn.

Deze patiëntengids bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en na de behandeling met het dexamethason-implantaat.

Waarom zou ik deze patiëntengids lezen?

Behandeling 2

Hoe moet ik me voorbereiden op mijn behandeling? 2

Wat houdt mijn behandeling in? 3

Wat gebeurt er na mijn behandeling? 3

Waar vindt u meer informatie 4

OZDX-NL-00006-FM (v4.0)

Versie 3.0 - Feb 2024

Waarom zou ik deze patiëntengids lezen?

Behandeling met het dexamethason-implantaat kan gepaard gaan met de volgende risico's:

- Verhoogde druk in het oog, wat kan leiden tot glaucoom (een oogziekte die verlies van gezichtsvermogen veroorzaakt).
- Ontsteking in het oog (meestal veroorzaakt door een infectie).

Om verergering te voorkomen/ernstige gevolgen tot een minimum te beperken, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van vroege tekenen en symptomen van deze risico's die verband houden met het dexamethason-implantaat.

U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige wanneer u één van deze tekenen en symptomen ervaart na behandeling met het dexamethason-implantaat.

- Verslechtering van uw zicht na de injectie.
- Pijn of ongemak in of rond het oog.
- Meer zwevende deeltjes of vlekken in uw zicht.
- Wazig zicht, langer dan één dag na de injectie.
- Roodheid in het oog die steeds erger wordt.
- Verlies van vocht uit het oog.

Hoe moet ik me voorbereiden op mijn behandeling?

Volg de door uw arts eventueel voorgeschreven behandeling voorafgaand aan de injectie nauwkeurig op.

Wat houdt mijn behandeling in?

Om u voor te bereiden op uw behandeling, zal de arts:

- Uw oog reinigen om infectie tegen te gaan en eventueel nog antibiotische oogdruppels toedienen.
- Uw gezicht bedekken met een speciale doek.
- Uw oog verdoven zodat u geen pijn voelt.
- Een instrument gebruiken om uw oog voorzichtig open te houden.

De arts zal dan een speciaal ontworpen applicator gebruiken om het medicijn door het oogwit te injecteren. U kunt tijdens deze procedure een klikgeluid horen en een beetje druk op het oog voelen.

Uw arts zal dan routinematige oogonderzoeken uitvoeren om zeker te zijn dat het medicijn met succes is toegediend.

Wat gebeurt er na mijn behandeling?

Na de injectie:

- Kan uw zicht ongeveer een dag wazig zijn.
- Kunt u ook enkele zwevende deeltjes of vlekken zien. Dat is normaal en zal na verloop van tijd moeten verdwijnen.
- Als deze symptomen niet verdwijnen of verergeren, neem dan contact op met uw arts.
- Als u normaal gesproken autorijdt of machines gebruikt, mag u dat pas weer doen zodra u niet meer wazig ziet.

Waar u meer informatie over uw medicijn kunt vinden

Zoals alle medicijnen kan het dexamethason-implantaat bijwerkingen veroorzaken, maar niet iedereen krijgt bijwerkingen. Een gedetailleerde lijst van mogelijke bijwerkingen is te vinden in de bijsluiter die bij het dexamethason-implantaat wordt geleverd.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op www.abbvie-rmm.nl/ozurdex.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Scan de QR-code voor een geluidsopname van deze patiëntengids of ga naar www.abbvie-rmm.nl/ozu-audio.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).