Risico op kanker

Upadacitinib kan mogelijk uw risico op het ontwikkelen van kanker verhogen, met name huidkanker.

Neem direct contact op met uw arts als u ziet dat een plekje op uw huid er anders uitziet of als u een nieuw plekje op uw huid ziet.

Risico op een gat in uw darm

Upadacitinib kan het risico op een gat in uw darm verhogen, vooral als u de ziekte van Crohn heeft.

Neem direct contact op met uw arts als u onverklaarbare of plotselinge buikpijn heeft.

Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener die betrokken is bij uw medische zorg, bijvoorbeeld uw tandarts of een arts op de spoedeisende hulp.

Neem contact op met het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl, om eventuele bijwerkingen te melden.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Versie 6.0 mei 2026

JAKa-NL-00087-FM (v5.0) | okt 2026

Uw naam:

.....

Naam arts (die upadacitinib heeft voorgeschreven):

.....

Telefoonnummer arts:

.....

Datum van start met upadacitinib:

.....

Patiëntenkaart

Houd deze kaart altijd bij u (of bij uw verzorger)

Veiligheidsinformatie over RINVOQ® (upadacitinib) voor patiënten

- Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u moet weten - vóór en tijdens de behandeling met upadacitinib.
- Lees de bijsluiter voor meer informatie.

Risico op infecties

Upadacitinib kan een bestaande infectie erger maken of de kans vergroten dat u een nieuwe infectie krijgt - bijvoorbeeld tuberculose, gordelroos of virale hepatitis.

Neem direct contact op met uw arts als u klachten van een infectie krijgt, zoals:

- Koorts, zweten, koude rillingen, gewichtsverlies of een hoest die niet overgaat - dit kunnen klachten zijn van tuberculose.
- Pijnlijke huiduitslag met blaasjes - dit kan een klacht zijn van gordelroos.
- Vermoeidheid of kortademigheid - dit kunnen klachten zijn van een longontsteking.

Neem ook direct contact op met uw arts als:

- U pas de diagnose tuberculose heeft gekregen of als u ooit tuberculose heeft gehad.
- U kortgeleden in nauw contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft.

Vaccins – helpen u te beschermen tegen infecties

Levende vaccins (bijvoorbeeld griepvaccin via neusspray, waterpokken, bof/mazelen/rodehond) mogen niet worden gegeven vlak vóór of tijdens de behandeling met upadacitinib.

Neem contact op met uw arts voordat u een vaccin krijgt. Uw arts weet welke vaccins u niet mag krijgen vóór of tijdens de behandeling met upadacitinib.

Risico op hartziekten

Upadacitinib kan mogelijk uw risico op hartziekten verhogen.

Neem direct contact op met uw arts als u klachten krijgt zoals pijn of een beklemmend gevoel op de borst. Dit kan een klacht zijn van een hartziekte.

Risico op bloedstolsels in aders of longen

Bloedstolsels in aders of longen zijn gezien bij het gebruik van upadacitinib.

Neem direct contact op met uw arts als u klachten krijgt van bloedstolsels in aders of longen, zoals een pijnlijk gezwollen been, kortademigheid of pijn op de borst.

Anticonceptie, zwangerschap en borstvoeding

Upadacitinib mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap.

- Gebruik betrouwbare anticonceptie tijdens het gebruik van upadacitinib - en tot 4 weken na uw laatste dosis. Vraag uw arts naar betrouwbare anticonceptie.
- Neem direct contact op met uw arts als u zwanger bent of wilt worden.
- Neem direct contact op met uw arts als uw kind voor het eerst ongesteld wordt (menstrueert) terwijl zij upadacitinib gebruikt.
- Geef geen borstvoeding tijdens het gebruik van upadacitinib.